


Algorithme de prise en charge : Régulation de la prise en charge d'un enfant ayant ingéré une pile bouton sans témoin

RÉGULATION DE LA PRISE EN CHARGE D'UN ENFANT AYANT INGÉRÉ UNE PILE BOUTON SANS TÉMOIN




Algorithme de prise en charge : Régulation : prise en charge d'un enfant ayant ingéré une pile bouton devant témoin

OBJECTIF

**RADIO THORACIQUE F +/- P
+/- ABDOMINALE
LE PLUS RAPIDEMENT
POSSIBLE POUR
ENDOSCOPIE DIGESTIVE
HAUTE DANS LES 2H SI
PILE OESOPHAGIENNE**

RÉGULATION : PRISE EN CHARGE D'UN ENFANT AYANT INGÉRÉ UNE PILE BOUTON DEVANT TÉMOIN



(1) PDSA

PERMANENCE DES
SOINS AMBULATOIRES

(2) SIGNES DE GRAVITÉ

- MALAISE ET PÂLEUR PERSISTANTS
- DÉTRESSE RESPIRATOIRE

(3) URGENCE À 2H

-DYSPHAGIE
OU DÉGLUTITION DOULOUREUSE
-HYPERSALIVATION
-DOULEUR THORACIQUE

(4) SUPER EXPERT

HÔPITAL EXPERT CAPABLE DE
RÉALISER EN URGENCE ET H24
UNE INTERVENTION CHIRURGICALE
THORACIQUE ET VASCULAIRE
CHEZ L'ENFANT.

(5) EXPERT

HÔPITAL CAPABLE DE
RÉALISER EN URGENCE ET
H24 UNE ENDOSCOPIE
DIGESTIVE HAUTE
CHEZ L'ENFANT.

Algorithme de prise en charge : dans le service des urgences




SCHÉMA 1 - Algorithme de prise en charge : pile œsophagienne




SCHÉMA 2 - Algorithme de prise en charge : pile gastrique




SCHÉMA 3 - Algorithme de prise en charge : pile intestinale

