



Populations vulnérables

Couple
ayant un
projet de
grossesse

Femme
enceinte

Nouveau-né

Dosage de la
chlordéconémie
tous les 6 mois suivant
le premier dosage de
chlordéconémie jusqu'à
la conception

Dosage trimestriel de la
chlordéconémie

Dosage de la chlordécone dans le sang du cordon après une **chlordéconémie** détectable chez la mère au cours de la grossesse, puis à partir d'1 an, suivi biométriologique similaire aux populations à risque de surexposition



Populations à risque de surexposition

Populations à risque de surexposition :

- les enfants de moins de 7 ans, en particulier ceux qui résident dans des maisons individuelles avec jardin ou qui fréquentent des aires de jeux ou de loisirs des zones contaminées, où le sol est accessible ;
- les personnes de plus de 7 ans résidant sur des zones contaminées, d'autant plus si elles sont onychophages ou ont un pica ;
- les travailleurs agricoles des exploitations agricoles en zones contaminées.

Evaluation de l'efficacité des mesures visant à réduire l'exposition au bout de 6 mois, par un dosage de la chlordéconémie, puis :

- tous les ans en cas de diminution de la chlordéconémie ;
- ou encore au bout de 6 mois en cas de stagnation ou de hausse de la chlordéconémie.

Après négativation de la chlordéconémie, possibilité de dosage de contrôle annuel de la **chlordéconé-**