




¹ travailleurs agricoles, résidents des zones contaminées, d'autant plus les personnes onychophages ou ayant un pica



Populations vulnérables



Populations adultes à risque de surexposition¹

Rappeler les préconisations de réduction de l'exposition à la chlordécone par le biais de l'alimentation

Femme
enceinte

Nouveau-né
exposé
in utero

Enfant de
moins de 7 ans
à risque de
surexposition

Chlordéconémie
détectable

Chez les hommes
quelle que soit la
chlordéconémie

Chlordéconémie
détectable en début
de grossesse

Chlordéconémie
détectable dans le
sang du cordon

Chlordéconémie
détectable

Résultat du dosage :

- < 0,4 µg/L : informations individualisées sur les habitudes alimentaires et le comportement
- ≥ 0,4 µg/L : soit idem ci-dessus, soit orientation vers un centre régional des pathologies professionnelles et environnementales (CRPPE)

Avis gynécologique
vis-à-vis du
risque de prématurité

Surveiller l'apparition de troubles neurodéveloppementaux :

- au cours de la première année pour les nouveau-nés
- puis annuellement jusqu'à 18 ans

Surveillance clinique
et biologique

Surveillance régulière des
signes d'alerte du cancer
de la prostate chez les
hommes à partir de 45 ans

¹ travailleurs agricoles, résidents des zones contaminées, d'autant plus les personnes onychophages ou ayant un pica